



LG 36300

LANÇAMENTO



Agrisure Viptera 3



VELOCIDADE ATÉ A COLHEITA

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS



TECNOLOGIA RECOMENDADA
ALTA



ARQUITETURA FOLIAR
SEMI ERETA



TIPO DE GRÃO
SEMIDENTADO AMARELADO



TOLERÂNCIA A NICOSULFURON
SIM



FINALIDADE DE USO
GRÃOS / SILAGEM



MATURIDADE RELATIVA EM DIAS
110



ÉPOCA DE PLANTIO
SAFRA / SAFRINHA

BENEFÍCIOS

- Hiper precoce;
- Antecipação de colheita;
- Adaptação ao verão sul e safrinha do cerrado baixo;
- Boa tolerância ao estresse hídrico.

QUADRO DE DOENÇAS

	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	+
Phaeosphaeria		•	•	•	•	•	•	•			
Cercosporiose		•	•	•	•	•	•	•			
Helminthosporiose		•	•	•	•	•	•	•			
Ferrugem Branca		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ferrugem Comum		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ferrugem Polissora		•	•	•	•	•	•	•			
Mancha de Diplodia		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Antracnose do Colmo		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Mollicutes (enfazamentos)		•	•	•	•						
Vírose (mosaico)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Fusarium (colmo)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Fusarium (grãos)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Diplodia (grãos)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Giberela (grãos)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Mancha de Bipolaris		•	•	•							
Estria Bacteriana (Xanthomonas vasculosa)											SI

Notas: 9 = alta tolerância / 1 = suscetível

*A reação a doenças pode sofrer variações em função do ambiente e ocorrência de forte pressão do patógeno.

RECOMENDAÇÕES DE PLANTIO

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
REGIÕES EDAFOCLIMÁTICAS	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
RS, SC, PR (baixo)		75			70	
RS, SC, PR (alto)		80			70-75	
VERÃO						
MG						Posicionamento restrito sob consulta
SP						Posicionamento restrito sob consulta
GO, DF						NR
BA						NR
TO						NR
MA, PI						NR
REGIÕES EDAFOCLIMÁTICAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	
	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	
PR (oeste) e MS (sul)		NR				
PR (alto)		NR				
PR (norte) e SP (sul)		NR				
SAFRINHA						
GO, DF (alto)						Posicionamento restrito sob consulta
MG						Posicionamento restrito sob consulta
GO (baixo)	NR	45-55	NR			
MT, RO	NR	55-60	NR			
MATOPIBA	NR	45-55	NR			

*População recomendada (x mil plantas/ha)
**NR: Não recomendada.

*Atenção especial ao controle da cigarrinha do milho, inseto vetor de espiroplasma e fitoplasma, causadores dos enfazamentos pálido e vermelho respectivamente.
Restrição de uso em área de alta pressão de viroses e mollicutes. *Necessita de 2-3 aplicações de fungicidas. Fazer manejo específico para o controle de mancha de Bipolaris. *** Atenção: áreas com histórico de Larva-Alfinete